Второй тип представлен бесцветными до розоватыми полупрозрачными и мутноватыми идиоморфными и удлиненно-призматическими цирконами и их многочисленными обломками. Размер зерен составляет 61–273 мкм. Содержание U=68–285 мг/т и Th=35–232 мг/т. Th/U отношение изменяются от 0,53 до 0,84, что характерно для цирконов магматического генезиса. Расчетный возраст для 6 точек составляет 2416 ± 15 млн.лет (рис. 2). Практически все точки лежат в центральных частях зерен. Кроме того, среди цирконов данного типа присутствуют единичные зерна, которые характеризуются либо высокими содержаниями урана – 238 мг/т и тория – 85 мг/т при Th/U=0.37, либо пониженным содержаниями урана – 24–76 мг/т по сравнению с торием – 81–85 мг/т при аномально высоком Th/U от 1.09 до 3.30 мг/т. Центральная часть большинства зерен темная со светлой каймой с тонкой или грубой зональностью. Данные цирконы дали конкордантные возраста около 2857 ± 17 млн.лет.

Таким образом дискордантный возраст 2416 ± 15 млн.лет, полученный по 6 зернам циркона, отражает время внедрения риодацитов в толщу андезибазальтов. Цирконы с возрастными 2765 млн.лет и 2857 ± 17 млн.лет были захвачены из пород фундамента при их плавлении. Полученные данные показывают, что определенный традиционным U-Pb методом неоархейский возраст формирования андезибазальтов сумия является весьма спорным для геологических построений по разграничению архейских и протерозойских комплексов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ проект № 05-05-65012 и ОНЗ РАН программа 6.

Литература

1. Бережная Н.Г., Мыскова Т.А., Арестова Н.А., Матуков Д.И., Пресняков С.Л., Антонов А.В., Сергеев С.А., Шулешко И.К. Возраст источника сноса ниже протерозойских осадков Кумсинской структуры Балтийского щита (U-Pb, SHRIMP-II) // Док. РАН. 2005. Т. 400, № 2, С. 214–218.
2. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000000 (новая серия). Лист Q-(35)-37. Кировск. Объяснительная записка. 2001. Спб. 597 с.
3. Левченков О.А., Богданов Ю.В., Саватенков В.М., Матреничев В.А., Яковлева С.З., Макеев А.Ф. Положение границы архея и протерозоя в Карелии // Док. РАН. 2001. Т. 377. № 3. С. 363–365.
4. Матреничев В.А. Граница архей – протерозой в северо-восточном крыле Лехтинской структуры Карелии // Общие вопросы расчленения докембрия. Апатиты. 2000. С. 155–157.
5. Матреничев В.А., Пинькова Л.О., Левченков О.А., Макеев А.Ф., Яковлев С.З., Алфимова Н.А. Древнейшая кора континентального выветривания гранитов на Балтийском щите // Док. РАН. 2005. Т. 400. № 1. С. 83–87.
6. Geological Map of the Fennoscandian Shield 1:2000000. 2003.

Морфоструктурные ансамбли новейшего этапа эволюции Беломорья

Зыков Д.С., Колодяжный С.Ю., Балувев А.С.

Геологический институт РАН, г. Москва, e-mail: zikov@ginras.ru

Северные районы Восточно-Европейской платформы хорошо изучены с позиций проявления вертикальных новейших движений. Однако в настоящее время появились сведения о проявлении неотектонической подвижности, имеющей не только вертикальную, но и горизонтальную компоненты перемещений [2, 4, 6]. В таком контексте могут быть проинтерпретированы новые материалы, полученные для района Беломорья. Исследования проводились на основе структурно-кинематических наблюдений и анализа морфоструктурных рисунков с последующим сравнением полученных результатов с тектонофизическими моделями [2].

Северо-западная часть Беломорской депрессии расположена преимущественно на кристаллических породах фундамента, а юго-восточная – на осадочных породах относительно маломощного чехла. Относительно древних комплексов фундамента Кандалакшско-Двинская и Онежская депрессии Белого моря располагаются в пределах Беломорско-Лапландского гранулитогнейсового пояса, заложившегося в неоархее и испытавшего неоднократную тектоническую ремобилизацию в палеопротерозое, рифее и фанерозое [1, 3]. Широкое распространение в районе имеют рифейские терригенные и вулканогенно-осадочные комплексы. Они выполняют систему палеорифтов – Кандалакшско-Онежско-Двинского и

Керецко-Среднепинежского, – которые облекают расположенный между ними Архангельский выступ фундамента (Рис. 1, А). Чехольный комплекс распространен в южной и юго-восточной частях района и состоит преимущественно из терригенных отложений венда, залегающих почти горизонтально.

В геоморфологическом отношении дно Белого моря представляет собой подводную ступенчатую аккумулятивно-денудационную поверхность, на которой преобладает ледниковый и морской морфогенез. Рельеф дна наиболее контрастен в районе Кандалакшского залива, особенно в юго-восточной его части, где отмечаются максимальные глубины до 340 м. Ступени морского дна широко развиты и контролируются строением блоков основания и неотектоническими нарушениями. Среди четвертичных отложений преобладают ледниковые и ледниково-морские отложения, достигающие наибольшей мощности (150 м) в прогибах дна юго-восточной части Кандалакшского залива. Приподнятые участки дна характеризуются значительно меньшими мощностями осадков – 3–20 м.

Современная Кандалакшко-Двинская депрессия, маркируемая акваторией Белого моря, имеет размеры примерно 450x100 км и вытянута с северо-запада на юго-восток. Ее форма в плане имеет линзовидный облик и относительно симметрична, что придает ей внешнее сходство с трещинами отрыва, образовавшимися за счет расхождения бортов. Строение ее в разных частях весьма различно. В северо-западной части депрессии расположен Кандалакшский новейший грабен, занимающий большую часть одноименного залива и имеющий протяженность около 300 км (Рис.1, А). Эта современная и наиболее активная морфоструктура возрождает рифейский грабен, о чем свидетельствуют активные опускания авлакогена в новейшее время, сопровождаемые возрождением большинства разломов с формированием крутых тектонических эскарпов и проявлением вдоль них многочисленных очагов землетрясений. В юго-восточной, Двинской части рельеф дна менее контрастен, мощности четвертичных отложений и глубины менее значительны.

Рис. Два возможных варианта интерпретации эволюции Беломорского региона на неотектоническом этапе: А – модель “расклинивания”, Б – модель “трансформных разломов и вращения блоков”:

1 – 2 – области современных: 1 – поднятий, 2 – прогибов; 3 – Архангельский выступ фундамента (Ар); 4 – зоны трансформных разломов; 5 – разрывы с преимущественно сбросо-сдвиговой (а) и надвиговой (б) кинематикой; 6 – оси тектонических депрессий; 7 – направления перемещений: а – тангенциальных, б – сдвиговых; 8 – предполагаемые направления: а – вращения, б – растяжения. Буквы на схеме: положительные морфоструктуры: Кл – Кулойская, Он – Онежская, Пн – Пинежская, Вп – Ветреного пояса; отрицательные морфоструктуры: Кн – Кандалакшская, Оз – Онежского озера, Ог – Онежской губы; трансформные зоны: ГС – Горло-Соловецкая, ОЧ – Онежско-Чешская, ЛП – линия Полканова; Юк – Южно-Кандалакшский опущенный блок

Результаты дешифрирования дистанционных материалов показывают, что Кандалакшский грабен обрамляется системой сбросо-сдвигов, образующих веерообразную систему, плавно раскрывающуюся с северо-запада на юго-восток к центральной части акватории Белого моря. В этой «растровой» области разрывы, образующие веер, плавно сливаются, либо пересекаются с поперечной системой нарушений преимущественно северо-восточного простирания, которая прослеживается от Горла Белого моря, через Соловецкие острова до системы разломов вдоль западного обрамления Карельского массива. Тектоническая позиция этой Горло-Соловецкой зоны и характер ее соотношений с веерообразной системой разрывов, контролирующей Кандалакшский грабен, позволяют, предположительно, рассматривать ее в качестве трансформного разлома. Аналогичная система веерообразных сбросо-сдвигов и поперечных нарушений дешифрируется и юго-восточнее, в районе Двинской депрессии (Рис. 1, Б).

Анализ глубинного строения подстилающих кристаллических пород позволяет дополнить картину морфоструктурных особенностей, получающуюся по результатам линеamentного анализа. В основании Двинской депрессии расположен Архангельский выступ кристаллического фундамента, вытянутый с юго-востока на северо-запад, куда он постепенно сужается. Выступ имеет видимые размеры примерно 350x100 км и, по данным сейсмического профилирования [5], выступает над окружающими его понижениями поверхности фундамента на 7-8 и более км. Выступ обрамляется среднерифейскими палеорифтами и является горстом, ограниченными разломами, падающими от него в разные стороны, что свидетельствует об увеличении его размеров с глубиной. Рифейские палеорифты, обрамляющие Архангельский выступ, в рельефе дневной поверхности выражены совсем не так, как аналогичные структуры современного Кандалакшского грабена, расположенные на одной оси с Архангельским выступом (Рис. 1, А). Онежский грабен палеорифта проходит примерно по Онежскому, а Керецкий – в основном по Кулойскому новейшим поднятиям. Привлечение идей о горизонтальной новейшей подвижности позволяет объяснить эти тектонические и морфоструктурные особенности территории.

Согласно современным геодинамическим взглядам, свод Балтийского щита смещается в юго-восточном направлении, как бы «наваливаясь» на окраину Русской плиты [6]. При этом он взаимодействует с ней, испытывая ее сопротивление, что и объясняет, отчасти, появление пограничных грабенов. Естественно, что в этих условиях будут деформироваться как окраина плитной части платформы, так и сам щит. В рассматриваемом случае Кандалакшский грабен находится на продолжении Архангельского выступа, который имеет вытянутую форму и сужается к северо-западу. Учитывая то, что этот выступ фундамента является достаточно компетентной неоднородностью земной коры, то можно предположить, что в условиях давления со стороны Балтийского щита он будет являться индентором, или клином, который в новейшее время раздвигает борта грабена, т.е. дает дополнительный импульс к расхождению берегов Карелии и Кольского полуострова (Рис. 1, А). Таким образом, Архангельский выступ вносит свой вклад в общее аномальное прогибание современного Кандалакшского грабена, который с этой точки зрения можно рассматривать как трещину расклинивания перед препятствием.

В качестве альтернативного варианта интерпретации можно рассматривать модель, учитывающую роль трансформных разломов, посредством которых адаптируются ротационно-раздвиговые перемещения Беломорского региона (Рис. 1, Б). Вместе с тем, не исключено, что в данном случае имеет место комбинированный вариант динамического развития: процессы расклинивания проявляются на фоне адаптационных трансформных перемещений, либо чередуются с ними во времени.

Гранты РФФИ № 06-05-64848, 07-05-01158.

Литература

1. Балувев А.С. и др. // Геотектоника, 2000, № 5. С. 30-43.
2. Зыков Д.С. Новейшая геодинамика Северо-Карельской зоны (Балтийский щит). М.: ГЕОС, 2001. 146 с.
3. Колодяжный С.Ю. Структурно-кинематическая эволюция юго-восточной части Балтийского щита в палеопротерозое. М.: ГЕОС, 2006. 332 с.
4. Копп М.Л. Мобилистическая неотектоника платформ Юго-Восточной Европы. М.: Наука, 2004. 340 с.
5. Хераскова Т.Н. и др. // Геотектоника, 2006, № 6. С. 33–51.
6. Юдахин Ф.Н. и др. Глубинное строение и современные геодинамические процессы в литосфере Восточно-Европейской платформы. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 299 с.