Кимберлитоподобные брекчии Костомукшского рудного района**Раевская М.Б., Горьковец В.Я., Попов М.Г.**Институт геологии, КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, e-mail: gorkovet@krc.karelia.ru

Высококалийевые щелочные ультраосновные породы на Костомукшском железорудном месторождении впервые были обнаружены при изучении особенностей геологического строения месторождения (Чернов В.М., Инина К.А. и др., 1960 г), в том числе и содержащие псевдоморфозы по лейциту [3]. Позже эти породы были определены как лампроиты [2], а на основании находки алмазов в эксплозивных брекчиях в качестве перспективного было выделено Костомукшское лампроитовое поле (Журавлев В.А. и др., 1994 г).

В опубликованной и фондовой литературе неоднократно упоминались встреченные в пределах Костомукшского рудного поля брекчии кимберлитового и лампроитового состава без конкретного их описания и характеристики петрохимических особенностей содержащихся в них минералов-спутников алмазов.

В последние годы в карьере Костомукшского железорудного месторождения обнаружены две диатремы. Одна из них, найденная в 2005 г., имеет около 200 м в диаметре и сложена кимберлитоподобными брекчиями. Брекчии мелко- и среднеобломочные. Они состоят из ксенолитов вмещающих лопийских пород и включений оталькованных глубинных гипербазитов, сцементированных магматической существенно флогопитовой породой.

Включения гипербазитов резко преобладают (их количество достигает иногда 50%). В основном они имеют округлую форму, реже угловатую. Их размер варьирует от нескольких миллиметров до 5 см.

Глубинные гипербазиты включений полностью замещены тонкозернистым тальком с небольшой примесью серпентина и септохлорита. В них присутствует тонкозернистая (менее 3 микрон) вкрапленность пентландита. На контакте включений гипербазитов с цементом образовалась реакционная кайма шириной до 2 мм.

Угловатые ксенолиты лопийских пород имеют уплощенную форму. Их размер достигает 7×15 см.

Цементирующая порода состоит более чем на 60% из тетраферрифлогопита и продуктов кристаллизации стекла (около 20%). В небольших количествах встречаются карбонат, калиевый рихтерит, прайдерит, апатит, стронциевый апатит, монацит, хромдиопсид, пироп, хромшпинелид, пирротин, нацелозамещенный оливин.

По минеральному составу и химизму рассматриваемые породы соответствуют кимберлитам II группы- слюдястым кимберлитам (оранжитами). Минералогические исследования кимберлитоподобных брекчий были проведены Ю.Л. Крецером и Н.С. Рудашевским с использованием электроимпульсного метода разрушения породы, гидросепаратора HS-II, микроанализатора Camscan-40V и спектрометра Link AN-10000. Примененная оригинальная методика получения тяжелых концентратов позволила достаточно полно выделить акцессорные минералы и обнаружить характерный набор минералов-спутников алмаза. Полученные данные по их химизму являются важной характеристикой рассматриваемых пород.

Гранаты. Фиолетовые магнезиальные ($MgO=23,38-24,88\%$) гранаты (Ан.1-7) являются высокохромистыми ($Cr_2O_3=5,26-5,85\%$), низкокальциевыми ($CaO=2,59-2,80\%$) и низкожелезистыми ($100 \cdot Fe^{2+}/Fe^{3+}/Fe^{2+}+Fe^{3+}+Mg=11,8-13,2\%$) пиропами (рис. 1), соответствующими гранатам группы 10 по классификации Стефенсона и Доусона [1]. По классификации Н.В.Соболева [2], а также предыдущих авторов, такие гранаты типичны для стростков с алмазами и включений в алмазах и относятся к гарцбургит-дунитовому парагенезису.

Хромшпинелиды в основном относятся к изоморфному магнезиальному ряду магнохромит (Ан. 14-19) – алюмохромит (Ан. 20-23) – хромпикотит (Ан. 24, 25. Рис.2). Одно зерно (Ан. 26) является субжелезистым алюмохромитом, а другое (Ан. 27) – железистым алюмохромитом членом ряда железистый хромит-магнетит (рис. 2). Магнохромиты с содержанием Cr_2O_3 более 60% относятся к гарцбургит-дунитовому парагенезису. А магнохромит (Ан. 14) с содержаниями $Al_2O_3=6,62\%$, $Cr_2O_3=63,30\%$, $TiO_2=0$ и

величиной отношения $100 \cdot \text{Fe}^{2+} / \text{Fe}^{2+} + \text{Mg} = 28,1$ по классификации Н.В.Соболева [2] соответствует хромитам – включениям в алмазах или образующим сростки с алмазами. Магнохромит (Ан. 15) имеет сходный состав с предыдущим. В нем несколько завышено содержание $\text{Al}_2\text{O}_3 = 7,37\%$. Магнезиальные алюмохромиты (Ан. 20-23) с содержанием $\text{Cr}_2\text{O}_3 = 45,91-58,92\%$ обычны в перидотитах глубинных включений, иногда содержащих алмазы. Магнезиальные хромпикотиты красного цвета (Ан. 24, 25. Рис.2) характеризуется высоким содержанием $\text{Al}_2\text{O}_3 = 35,16-40,64\%$ и низким $\text{Cr}_2\text{O}_3 = 29,97-33,92\%$. Охарактеризованные выше хромшпинелиды мы относим к первичным, а субжелезистые хромпикотиты черного цвета, образующие каймы вокруг красных хромпикотитов, считаем вторичным.

Рис.1. Диаграмма $100 \cdot \text{FeO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 / \text{FeO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{MgO} - \text{SiO}_2$ для лампроитовых пород Костомукши:

- – лампроиты магнезиальной серии;
- Δ – лампроиты железистой серии.

Рис.2. Диаграмма $\text{Al}_2\text{O}_3 - \text{MFT}(\text{MgO} / \Sigma \text{FeO} + \text{TiO}_2)$ для калиевых пород по С.М.Саблукову [11]:

- ◇ – «примитивная мантия»;
- – «деплетированная мантия»;
- – лампроиты магнезиальной серии Костомукши

Рис.3. Диаграмма $\text{MgO} - \Sigma \text{FeO} + \text{TiO}_2 - \text{Al}_2\text{O}_3$ (масс.%) для лампроитовых пород Костомукши:

Линиями показаны тенденции изменения составов кимберлитов Al и Fe-Ti серий и лампроитов 3.Австралии по С.М.Саблукову [12].

Точки – лампроиты магнезиальной серии Костомукши

Рис.4. Диаграмма $\text{CaO} + \text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} - \text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3$ для пород ультракалиевой серии:

- Δ – мелноитовые кимберлиты;
- – лампроиты магнезиальной серии Костомукши

Клинопироксены ярко-зеленого цвета, магнизиальные ($MgO=15,09-18,91\%$) с повышенным содержанием Cr_2O_3 . В их составе отсутствует примесь K_2O . По величине отношения $100 \cdot Ca/Ca+Mg$ клинопироксены разделяются на две группы (рис. 3, 4) субкальциевые (Ан. 12, 16, 19) и кальциевые (Ан. 13-15, 17, 18, 20-23).

В субкальциевых клинопироксенах (рис. 4) отмечается высокое содержание $Cr_2O_3=2,19-2,92\%$. Малая величина отношения $100 \cdot Ca/Ca+Mg=40,3-43,18$ свидетельствует о высокой температуре их образования, порядка $1200-1100^\circ C$ [2]. Эти клинопироксены (Ан. 12, 16, 19) по классификации Стефенсона и Доусона [1] соответствуют группе 6 юритовые диопсиды.

Кальциевые клинопироксены (Ан. 13-15, 17, 18, 20-23) имеют широкие вариации химического состава (рис. 3, 4). Величина отношения $100 \cdot Ca/Ca+Mg=44,9-51,6$ соответствует умеренной и низкой температуре их кристаллизации в интервале $1050-850^\circ C$ [4]. По химическому составу они соответствуют хромдиопсидам группы 5 и частично приближаются к юритовым диопсидам группы 6 по классификации Стефенсона и Доусона. Такие клинопироксены обычно для кимберлитов и лампроитов, где они происходят за счет дезинтеграции перидотитов и пероксенитов. По классификации Н.В.Соболева [4] клинопироксены, имеющие следующие химический состав $100 \cdot Ca/Ca+Mg=45,1-48,6$, $100 \cdot \Sigma Fe/\Sigma Fe+Mg=3,5-6,7$, $Cr_2O_3=0,69-3,54\%$, $Al_2O_3=1,5-3,14\%$, $MgO=15,3-17,3\%$, $CaO=17,5-22,1\%$, $Na_2O=1,31-3,33\%$ встречаются в виде включений в алмазах или сростков с алмазами. Этим требованиям соответствуют хромдиопсиды анализов 13-15,7 (рис. 3, 4). Все клинопироксены относятся к ультраосновному парагенезису.

Таким образом кимберлитоподобные брекчии содержат минералы-индикаторы, характерные для высокоалмазоносных кимберлитов II разновидности – оранжевых.

Вторая диатрема, фрагмент которой имеет овальную форму и достигает 15 м по длинной оси сложена крупнообломочными брекчиями, состоящими на 90% из округлых и эллипсоидальных фрагментов серпентинитов по гранатовым дунитам размером до 16×30 см. Гранат в них нацело замещен тонкозернистым агрегатом хромшпинелида и хлорита, в виде микровкрапленности присутствуют миллерит, самородное серебро, сернистое серебро, хромдиопсид и хромшпинель.

Для хромшпинелидов второй диатремы характерны значительные колебания большинства окислов (Cr_2O_3 , Al_2O_3 , FeO , Fe_2O_3 , TiO_2 , MgO) (рис. 2). Эти хромшпинелиды относятся в основном к магнизиальному изоморфному ряду магнохромит (Ан. 1, 2) – алюмохромит (Ан. 3-8) – хромпикотит (Ан. 9-10) и лишь одно зерно (Ан. 12) – железистый алюмохромит относится к ряду железистый хромит-магнетит. Магнохромиты ($Cr_2O_3 > 60\%$) (Ан. 1, 2) относятся к гарцбургит-дунитовому парагенезису. Их разновидность (Ан. 1) с содержанием $Cr_2O_3=63,60\%$, $Al_2O_3=6,01\%$ и величиной отношения $100 \cdot Fe^{2+}/Fe^{2+}+Mg=20,8$ по классификации Н.В.Соболева [4] соответствует хромитам – включениям в алмазах или образующим сростки с алмазами (рис. 2). Магнизиальные алюмохромиты ($Cr_2O_3=48,25-50,44\%$) встречаются в мантийных ультрабазитовых включениях, иногда содержащих алмазы. Магнизиальные хромпикотиты красного цвета (Ан. 9,10) имеют высокое содержание Al_2O_3 и низкое Cr_2O_3 (рис.2). Перечисленные выше хромшпинелиды являются первичными. Вторичные хромпикотиты развиты или в виде каймы (Ан. 11) вокруг первичных хромпикотитов красного цвета (Ан. 10), или образуются при замещении граната келифитом (Ан. 13).

Находка кимберлитоподобных брекчий (оранжевых) с высокобарическими минералами-спутниками алмаза, петрохимические особенности которых аналогичны таковым минералов-спутников в высокоалмазоносных кимберлитах, является убедительным доводом в пользу возможности выявления в Костомукшском рудном районе промышленных месторождений.

Литература

1. Дж.Доусон. Кимберлиты и ксенолиты в них. М.: Мир, 1983. 300с.
2. Проскуряков В.В., Увадьев Л.И., Воинова О.И. Лампроиты Карело-Кольского региона, Изв. АН СССР, т. 314, № 4.
3. Раевская М.Б., Горьковец В.Я. Дайковый комплекс щелочных-ультраосновных пород района Костомукшского железорудного месторождения. –В кн. Операт.-информ. Матер. За 1977г. Петрозаводск, 1978 г., с. 47–51.
4. Соболев Н.В. Глубинные включения в кимберлитах и проблема состава верхней мантии. Новосибирск.: Наука СО, 1974. 264 с.