



ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ВЕСЕННИХ МИГРАЦИОННЫХ ОСТАНОВОК ГУСЕЙ В ВЕРХНЕВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ РОССИИ

**В.О. Авданин, Ю.А. Анисимов¹, П.М. Глазов², К.Е. Литвин¹,
О.Б. Покровская¹**

¹Центр кольцевания, ²Институт географии РАН, Москва, Россия

Исследования в рамках международного проекта «Весна» (МАТРА, Нидерланды) проводятся в 4 областях (Ярославская, Владимирская, Ивановская, Костромская) для выявления основных мест концентраций гусей (MSA – major staging areas) и их пролетных путей. Обнаружены новые MSA на пролете и обследованы ранее известные территории. Основные факторы, влияющие на состояние MSA – охота и различные факторы беспокойства, состояние кормовой базы, метеорологические условия. Непрофессионально организованная охота наносит наибольший вред гусям в период миграции. Весенние палы – другой сильный фактор нарушения местообитания гусей.

Отмечена повсеместная деградация местообитаний мигрирующих гусей. В настоящее время, они концентрируются вблизи крупных административных и промышленных центров, если этому соответствует плодородие почв. Посевные площади за последние 20 лет сократились во всех 4 областях в 1,7 – 2,5 раза, что характерно для всей центральной Европейской части России. Экономический спад сельскохозяйственного производства напрямую отражается на состоянии и качестве полей. Сокращаются посевные площади – основа кормовой базы гусей весной.

Методом шейных меток нами было доказано что через Русскую равнину мигрируют белолобые гуси западноевропейской популяции. За 2008-2009 нами в Кологриве было помечено 144 белолобых гусей. Процент повторных наблюдений в Европе в 2008 году составил – 80%, в 2009 году – 66%. Гуси были отмечены в Голландии, Германии, Польше, Бельгии, Дании.



Сейчас наиболее актуальная задача – принятие единого плана управления популяциями гусей, мигрирующих через Европейскую часть России всеми региональными структурами управления охотничьим хозяйством и охотпользователями.



ПОЛО-ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ МАССОВЫХ СКОПЛЕНИЙ ЛАДОЖСКОЙ КОЛЬЧАТОЙ НЕРПЫ НА ЛЕТНИХ ЗАЛЕЖКАХ НА ОСТРОВАХ ВАЛААМСКОГО АРХИПЕЛАГА

Е.В. Агафонова, М.В. Соколовская, В.Ю. Шахназарова

Ленинградский зоопарк, Санкт-Петербург, Россия

Наблюдения проводились в летние месяцы 2001–2009 годов на островах Валаамского архипелага. В безветренную погоду осуществлялись регулярные учеты залежек и числа тюленей на них по всем островам в районе исследования. Регистрировалось число животных разных возрастных групп: детенышей, появившихся на свет весной текущего года и существенно отличающихся по своим весовым и размерным характеристикам от взрослых нерп, а также животных старше одного года. Пол взрослых тюленей определяли в ходе визуальных наблюдений за нерпами, размещающимися на береговых залежках.

В ходе учетов, проводимых на протяжении восьми летних сезонов, детеныши на релаксационных залежках ладожской кольчатой нерпы на островах Валаамского архипелага отмечались чрезвычайно редко. Взрослые особи (животные старше 1 года) ежегодно (в ходе каждого учета) составляли более 99% от всех залегающих на островах тюленей. Единичные встречи детенышей были зафиксированы на всех островах в районе исследования, при этом выделить залежки, наиболее активно используемые щенками, не представляется возможным.