



ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ГЛУХАРЯ И ТЕТЕРЕВА В ТАЕЖНЫХ РЕГИОНАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

Ю. Курхинен¹, П. Данилов², В. Белкин², В. Ефимов³, Х. Линден¹,
С. Кочанов⁴, В. Мамонтов³, П. Хелле¹

¹*Finnish Game and Fisheries Research Institute, Viikinkaari, Helsinki, Finland.
harto.linden@rktl.fi, juri.kurhinen@rktl.fi, pekka.helle@rktl.fi,*

²*Институт биологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск,
Россия. danilov@krc.karelia.ru*

³*Институт экологических проблем Севера Уральского отделения РАН,
Архангельск, Россия*

⁴*Институт биологии Коми научного центра РАН, Сыктывкар, Россия*

Проанализированы данные Зимнего маршрутного учета за 2000-2009 гг. от Финляндии до республики Коми.

Более высокие и наиболее стабильные показатели **численности тетерева** зафиксированы в Восточной Фенноскандии (Финляндия-4.4, Карелия – 3.6 птиц на 10 км; коэффициент вариации соответственно 27% и 12%). В Мурманской и Архангельской обл. показатели обилия тетерева 0.5 и 2.5 встреч на 10 км маршрута соответственно, а коэффициенты вариации – 56 и 20%. Для **глухаря** наиболее высокие показатели учета зафиксированы в Финляндии, наименьшие – в Архангельской и Мурманской обл. В Коми численность глухаря близка к средней по Европейскому Северу (0.36) но наиболее стабильна.

Для глухаря и тетерева **годы «пиков» и минимальных значений численности** не совпадают по отдельным регионам таежного севера Европы.

Общие тренды динамики численности обоих видов в Мурманской и Архангельской области совпадают между собой (положительная корреляция, для глухаря – довольно высокая, 0.83). В Финляндии и Карелии в 2000-2009 гг. они достоверно отрицательно коррелируют с таковой в Архангельской области (-0.6 для тетерева), и слабо положительно – между собой. Существо-



ют различия в численности обоих видов на севере Европы и в ее динамике по годам.



ВОДНО-БОЛОТНЫЕ ПТИЦЫ ОЛОНЕЦКИХ ВЕСЕННИХ СКОПЛЕНИЙ (РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ)

Н.В. Лапшин, В.Б. Зимин, А.В. Артемьев, А.Р. Тюлин, С.А. Симонов

*Учреждение Российской Академии наук Институт биологии
Карельского НЦ РАН, Петрозаводск, Россия, lapshin@krc.karelia.ru*

Крупные весенние стоянки водно-болотных птиц на Беломорско-Балтийском пролетном пути сосредоточены в восточном Приладожье. Их несколько, но основная расположена на сельскохозяйственных угодьях в окрестностях г. Олонец (Республика Карелия). Основные итоги изучения гусей и казарок, для которых эта стоянка является основной перед перелетом на места гнездования, опубликованы ранее (Зимин и др., 2007). Настоящая публикация является подведением итогов многолетних наблюдений на олонецких полях за утками и куликами в период весенних миграций. Их образуют птицы, гнездящиеся в лесной и тундровой зоне России и зимующих главным образом в Европе и Африке. К настоящему времени в период с середины апреля до конца мая в этом районе отмечено 7 видов речных, 8 – нырковых уток, 3 вида крохалей и 26 видов куликов. Определены сроки появления и исчезновения (для пролетных) изучаемых видов из района наблюдений, численность и ее вариации в разные годы, места их зимовки.

