



АНАЛИЗ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БОБРОВ, ОБИТАЮЩИХ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ

Ф.В. Фёдоров

ИБ КарНЦ РАН, Петрозаводск, Россия

В настоящее время на Европейском Севере России обитает 2 вида бобров – канадский и европейский. Популяция канадских бобров берёт начало от 7 зверей из США, выпущенных в 1937 г., в Финляндии (Linnamies, 1956; Siivonen, 1956; Lahti, 1968; Ermala et al., 1989), потомки которых впоследствии расселились на территорию России. Европейских бобров выпускали во всех областях Европейского Севера, кроме Карелии. Источниками расселения послужили звери из Воронежской, Смоленской обл., Белоруссии, Марийской АССР и т.д. Обсуждается происхождение бобров, обитающих на территории совместного обитания двух видов.



ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ ДИКОГО ЛЕСНОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ (*Rangifer tarandus fennicus* Lönnb.) В КУХМО-КАМЕННООЗЕРНОЙ СУБПОПУЛЯЦИИ С 1950-Х ГГ. ДО 2010 Г. С ОСОБЕННЫМ ВНИМАНИЕМ НА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

К. Хейкура¹, Й. Туомиваара²

¹Зоологический музей Университета Оулу, Оулу, Финляндия

²Институт охотничьего и рыбного хозяйства Финляндии, Оулу, Финляндия

Дикий лесной северный олень был истреблен в Финляндии в начале 20-го века. Подвид выжил на территории Карелии в России,