



ций с токами в качестве центрального места годичной активности. У обоих видов самцы оставались ближе к токовищу круглый год, чем самки. Группа самцов, посещающих одно токовище использовала годовой участок обитания примерно 40 км^2 , а у самок он был 50 км^2 . И самцы, и самки демонстрировали сильную привязанность к месту и возвращались на те же самые сезонные участки в последующие годы. Среднее расстояние между расположением самцов глухаря на протяжении двух последующих дней составляло примерно 400 м. Это, вероятно, можно объяснить анти-хищническим поведением. Плотность и распространение тетеревов и глухарей связаны с характеристиками ландшафта в крупном масштабе и с составом леса в мелком масштабе.



ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СХЕМ ТИПОВ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ

Р.А. Шадрин

Институт биологии КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, Российская Федерация

«...работы по охотоустройству, проводимые многими учреждениями, не координированы и не увязаны в методическом отношении. Назрела необходимость ... согласования действующих инструкций и методических указаний, унификации охотхозяйственных понятий и терминов, утверждения норм работ, решения вопроса о подготовке квалифицированных кадров, постановки научной разработки охотоустроительных проблем» (Д. Н. Данилов, 1966).

Как будто сегодня сказано, а не сорок с лишним лет назад! Задачи, сформулированные для охотоустройства Д. Н. Даниловым с соавторами в 1966 году, не решены и по сей день. Это относится и к разработке региональных схем типов охотничьих угодий. Под типом охотничьих угодий мы понимаем совокупность выделения одного типа



леса с одинаковым видовым составом, плотностью населения и условиями обитания охотничьих животных, при одинаковой интенсивности хозяйственного использования требующих и пригодных к проведению одних и тех же хозяйственных мероприятий. Под хозяйственными мероприятиями здесь должен пониматься комплекс мероприятий, проектируемых и проводимых в охотничьем хозяйстве.

Региональная схема типов охотничьих угодий должна разрабатываться с учётом всего комплекса условий и особенностей конкретного Субъекта РФ, в т.ч. для лесных охотничьих угодий – с учётом региональной схемы типов леса, разработанной лесоустройством. Разработка региональной схемы типов охотничьих угодий – одно из условий грамотного, научно-обоснованного управления ресурсами охотничьих животных региона, т.к. это шаг к пониманию сложной взаимосвязи популяций охотничьих животных и растительных сообществ. Также разработка региональных схем типов охотничьих угодий позволит создать единую методическую основу инвентаризации охотничьих угодий, понять закономерности динамики типов охотничьих угодий и повысить качество охотоустроительного проектирования в целом.



НОРКА ЕВРОПЕЙСКАЯ И АМЕРИКАНСКАЯ (*MUSTELA LUTREOLA* И *M. VISON*), А ТАК ЖЕ ВЫДРА (*LUTRA LUTRA*) ДАРВИНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА И ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ю.А. Шемякина

Череповецкий Государственный Университет, Череповец, Россия

Работа проводилась в 2007–2010 гг. на территории Дарвинского Биосферного заповедника и на востоке Вологодской области. Обследовалось более 160 км речной сети 2 раза в год, где проводился